

転院先の医師に この用紙をお渡しください。

患者さんのお名前

用法・用量

- プラザキサカプセル **75mg** 1回2カプセル1日2回
- プラザキサカプセル **110mg** 1回1カプセル1日2回

服用開始日：令和 年 月 日

これまで通院していた病・医院名：

TEL ()

プラザキサには特異的中和剤があります。
詳細は以下のURLをご参照ください。

<http://prizbind.jp> プリズバインド 

プラザキサを服用されている患者さんへ

- 75mg カプセル1回2カプセルを1日2回服用してください。**



- 110mg カプセル1回1カプセルを1日2回服用してください。**



- 飲み忘れた場合は、絶対に2回分をまとめて1度に服用せず、気が付いた時にできるだけ早く1回分を飲み、次の服用まで6時間以上空けてください。
- **誤って多く飲んだ場合は**、すぐに主治医にご相談してください。
- ご自分の判断で飲むのをやめたり、薬の量や回数を変更したりしないでください。

服用にあたっての注意点

- PTPシートから必ず飲む直前にとりだして、カプセルのまま飲んでください。
- 食直前(いただきますのすぐ前に)または食事中にコップ1杯の水で飲みましょう。

このような症状があらわれた場合には、
すぐに主治医に相談してください。

- **鼻や歯ぐきなどから出血が続く**
- **血尿や血便**(赤色または黒色便)がでた
- **あざ(内出血)**ができた
- **胸やけ・はきけ・むかつき**
- **転倒した、体(特に頭)をぶつけた**
- **脱水症状**

血が止まらなくなった場合の対応

血が止まるまで、通常より時間がかかります。出血部位を手指でしっかりとおさえ続けてください。血が止まっても止まらなくても、主治医に相談してください。

プラザキサには特異的中和剤がありますので、必ずプラザキサ服用中であることを医師に伝えてください。